

Перечень медицинских изделий и инструментария

Наименование медицинских изделий, инструментов	Количество вложений, шт.
--	--------------------------

Перевязочные средства

Бинт стерильный:	
50 см х 5 м № 1	20
10 см х 7 м № 1	20
16 см х 10 м № 1	20
Бумага компрессная в листах № 10	2
Вата гигроскопическая стерильная 50 г	5
Вата компрессная 200 г	2
Лейкопластырь:	
2,5 см х 5 м	2
6,0 см X 5 м	2
Пакет индивидуальный Марля 3 м	3

Медицинские инструменты и предметы ухода

Банка суховоздушная	10
Ванночка глазная	1
Грелка резиновая	1
Жгут резиновый	2
Зажим кровоостанавливающий	3
Иглы к шприцу разных размеров	10
Катетер резиновый	
Кружка для клизмы с набором	
Лубки фанерные	
Мочеприемник	
Носилки морские	
Ножницы	
Перчатки резиновые хирургические	
Пинцет анатомический	
Пинцет хирургический	1
Пипетка глазная	3
Пузырь для льда	1
Щольтник	1
Стаканчик для приема лекарств	1
Скальпель	1
Стерилизатор средний	
Судно подкладное	
Термометр максимальный	
Шина проволочная для фиксации конечностей	
Шприц "Рекорд" 5 мл	
Шкафчик для хранения медикаментов, перевязочного материала и медоборудования	

Перечень медикаментов и рекомендации по их применению

Наименование медикамента	Вид упаковки	Кол-во в судовой аптечке, штук	Показания к применению	Способ приема и дозировка	Примечание
1 Карбромал	Трубка № 6	3	Успокаивающее средство при нервности, истерии, возбуждении психически больных	В таблетках по 0,3-0,5 г. Принимают 2-3 раза в день, запивают теплой водой	Максимальная суточная доза 1,0-2,0 г
2 Активированный уголь (карбон)	Упаковка	10	При пищевых отравлениях (грибы, колбаса и рыба), отравлениях солями тяжелых металлов и алкалоидами, скоплении газов в кишечнике	При острых отравлениях: промывают желудок взвесью из 1 столовой ложки угля на 1/2 л воды или взвесью из 1 столовой ложки угля на 1-2 стакана воды (повторно) с последующим промыванием желудка водой и приемом слабительного; при скоплении газов в кишечнике: по 1 таблетка 3-4 раза в день	Назначают при отравлениях по 20-30 г на прием в виде взвеси в воде
3 Сульфацил	Флакон 50 г	1	При заболеваниях глаз (кератит, конъюнктивит), при травмах и попадании инородных тел	Закапывают в глаза по 1-2 - капли 3 раза в день	
4 Анальгин с амидопирином	Конвалюта № 6	5	При остром суставном ревматизме, миозите (воспалении мышц), радикулите, головной боли	Принимают внутрь по 0,5 г 2-3 раза в день	
5 Магния сульфат	Коробка	5	При отравлениях как слабительное (слабительный эффект наступает через 2-4 ч); при холедистите как желчегонное; при запорах	При отравлениях: 10-30 г на полстакана теплой воды; как желчегонное: утром натощак по 1 столовой ложке 3 раза в день (20-25 г на 100 г воды)	

Наименование медикамента	Вид упаковки	Кол-во в судовой аптечке, штук	Показания к применению	Способ приема и дозировка	Примечание
6 Аскофен	Конвалюта № 6	5	При головной боли и невралгических болях и лихорадочном состоянии как болеутоляющее, жаропонижающее, противовоспалительное и противоревматическое средство	Принимают внутрь по 1 таблетке 2-4 раза в день	
7 Кислота	Конвалюта № 6	5	При головной и невралгических болях и лихорадочном состоянии как болеутоляющее, жаропонижающее, противовоспалительное и противоревматическое средство	Принимают внутрь по 1 таблетке 2-4 раза в день; при остром ревматизме: по 1 таблетке через каждые 4 ч	Максимальная суточная доза 4-5 г
8 Сульфат атропина	Пиллюли	5	При язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритах, холециститах, при спазмах мочевых путей, бронхиальной астме	Принимают внутрь по одной пиллюле 0,00025-0,0005 г	Внимание, сильное средство! 0,0005 г, максимальная суточная доза 0,003 г. При передозировке немедленно промыть желудок 0,1 %-ным раствором марганцовокислого калия, внутрь дать взвесь активированного угля и жженой магнезии. Противопоказание: глаукома
9 "Азрон"	Трубка № 10	5	При морской и воздушной болезни, понижает возбудимость центральной нервной системы, рвотного центра, уменьшает выделение сока слизистых оболочек и слюнных желез	Для профилактики морской болезни: принимают внутрь 1-2 таблетки за 30-60 мин до отхода, через 6 ч - еще 1 таблетку	Принимать не более 4 таблеток в день. Максимальная разовая доза - 2 таблетки, максимальная суточная доза - 4 таблетки

Наименование медикамента	Вид упаковки	Кол-во в судовой аптечке, штук	Показания к применению	Способ приема и дозировка	Примечание
10 Бикарбон	Конвалюта № 6	5	При болях в желудке и кишечнике (язвенная болезнь, гастрит и др.)	Принимают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день	
11 Бесалол	Конвалюта № 6	5			
12 Хлортетрациклин-гидрихлорид	Трубка № 6 Конвалюта № 6 Конверт	5	При воспалении легких, дизентерии, коклюше, септикемии, трахоме, инфекционных заболеваниях мочеполовой системы (для лечения гнойных очагов, ожогов и др. - в виде присыпок)	Принимают внутрь в таблетках за полчаса до еды. Разовая доза от 100 000 до 200 000 ед. 5-6 раз в день. Курс лечения 6-10 дней	При неэффективности лечения пенициллин заменяют биомицином. Противопоказания: грибковые заболевания кожи
13 Мазь хлортетрациклиновая	Тубус 25 г	2	При заболеваниях глаз (ячмень) и т.д.	Закладывать за веко стеклянной палочкой, прикладываемой к тубусу, 4-6 раз в день	Срок хранения 6 мес
14 Бумага бактерицидная	Лист	10	При мелких порезах	Накладывают на рану и забинтовывают	
15 Борная кислота	Коробка	2	При заболеваниях полости рта, кожи (трещины, экзема)	Для полоскания рта и глотки: 2-4 %-ный водный раствор (1 чайная ложка на стакан воды); для лечения кожных заболеваний: мазь (5-10 %), спиртовой раствор, присыпка	
16 Борный спирт (3-5 %-ный раствор)	Флакон 50,0 г	2	При заболеваниях уха	Закапывают в ухо 2 раза в день	
17 Вазелин медицинский	Банка 25,0 г	2		Применяется в качестве мазевой основы для смазывания катетера	
18 Вазелин борный	Тубус 30,0 г			То же	

Наименование медикамента	Вид упаковки	Кол-во в судовой аптечке, штук	Показания к применению	Способ приема и дозировка	Примечание
10 Бикарбон	Конвалюта № 6	5	При болях в желудке и кишечнике (язвенная болезнь, гастрит и др.)	Принимают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день	
11 Бесалол	Конвалюта № 6	5			
12 Хлортетрациклин-гидрихлорид	Трубка № 6 Конвалюта № 6 Конверт	5	При воспалении легких, дизентерии, коклюше, септикемии, трахоме, инфекционных заболеваниях мочеполовой системы (для лечения гнойных очагов, ожогов и др. - в виде присыпок)	Принимают внутрь в таблетках за полчаса до еды. Разовая доза от 100 000 до 200 000 ед. 5-6 раз в день. Курс лечения 6-10 дней	При неэффективности лечения пенициллин заменяют биомицином. Противопоказания: грибковые заболевания кожи
13 Мазь хлортетрациклиновая	Тубус 25 г	2	При заболеваниях глаз (ячмень) и т.д.	Закладывать за веко стеклянной палочкой, прикладываемой к тубусу, 4-6 раз в день	Срок хранения 6 мес
14 Бумага бактерицидная	Лист	10	При мелких порезах	Накладывают на рану и забинтовывают	
15 Борная кислота	Коробка	2	При заболеваниях полости рта, кожи (трещины, экзема)	Для полоскания рта и глотки: 2-4 %-ный водный раствор (1 чайная ложка на стакан воды); для лечения кожных заболеваний: мазь (5-10 %), спиртовой раствор, присыпка	
16 Борный спирт (3-5 %-ный раствор)	Флакон 50,0 г	2	При заболеваниях уха	Закапывают в ухо 2 раза в день	
17 Вазелин медицинский	Банка 25,0 г	2		Применяется в качестве мазевой основы для смазывания катетера	
18 Вазелин борный	Тубус 30,0 г			То же	

Наименование медикамента	Вид упаковки	Кол-во в судовой аптечке, штук	Показания к применению	Способ приема и дозировка	Примечание
10 Бикарбон	Конвалюта № 6	5	При болях в желудке и кишечнике (язвенная болезнь, гастрит и др.)	Принимают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день	
11 Бесалол	Конвалюта № 6	5			
12 Хлортетрациклин-гидрихлорид	Трубка № 6 Конвалюта № 6 Конверт	5	При воспалении легких, дизентерии, коклюше, септикемии, трахоме, инфекционных заболеваниях мочеполовой системы (для лечения гнойных очагов, ожогов и др. - в виде присыпок)	Принимают внутрь в таблетках за полчаса до еды. Разовая доза от 100 000 до 200 000 ед. 5-6 раз в день. Курс лечения 6-10 дней	При неэффективности лечения пенициллин заменяют биомицином. Противопоказания: грибковые заболевания кожи
13 Мазь хлортетрациклиновая	Тубус 25 г	2	При заболеваниях глаз (ячмень) и т.д.	Закладывать за веко стеклянной палочкой, прикладываемой к тубусу, 4-6 раз в день	Срок хранения 6 мес
14 Бумага бактерицидная	Лист	10	При мелких порезах	Накладывают на рану и забинтовывают	
15 Борная кислота	Коробка	2	При заболеваниях полости рта, кожи (трещины, экзема)	Для полоскания рта и глотки: 2-4 %-ный водный раствор (1 чайная ложка на стакан воды); для лечения кожных заболеваний: мазь (5-10 %), спиртовой раствор, присыпка	
16 Борный спирт (3-5 %-ный раствор)	Флакон 50,0 г	2	При заболеваниях уха	Закапывают в ухо 2 раза в день	
17 Вазелин медицинский	Банка 25,0 г	2		Применяется в качестве мазевой основы для смазывания катетера	
18 Вазелин борный	Тубус 30,0 г			То же	

Наименование медикамента	Вид упаковки	Кол-во в судовой аптечке, штук	Показания к применению	Способ приема и дозировка	Примечание
10 Бикарбон	Конвалюта № 6	5	При болях в желудке и кишечнике (язвенная болезнь, гастрит и др.)	Принимают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день	
11 Бесалол	Конвалюта № 6	5			
12 Хлортетрациклин-гидрихлорид	Трубка № 6 Конвалюта № 6 Конверт	5	При воспалении легких, дизентерии, коклюше, септикемии, трахоме, инфекционных заболеваниях мочеполовой системы (для лечения гнойных очагов, ожогов и др. - в виде присыпок)	Принимают внутрь в таблетках за полчаса до еды. Разовая доза от 100 000 до 200 000 ед. 5-6 раз в день. Курс лечения 6-10 дней	При неэффективности лечения пенициллин заменяют биомицином. Противопоказания: грибковые заболевания кожи
13 Мазь хлортетрациклиновая	Тубус 25 г	2	При заболеваниях глаз (ячмень) и т.д.	Закладывать за веко стеклянной палочкой, прикладываемой к тубусу, 4-6 раз в день	Срок хранения 6 мес
14 Бумага бактерицидная	Лист	10	При мелких порезах	Накладывают на рану и забинтовывают	
15 Борная кислота	Коробка	2	При заболеваниях полости рта, кожи (трещины, экзема)	Для полоскания рта и глотки: 2-4 %-ный водный раствор (1 чайная ложка на стакан воды); для лечения кожных заболеваний: мазь (5-10 %), спиртовой раствор, присыпка	
16 Борный спирт (3-5 %-ный раствор)	Флакон 50,0 г	2	При заболеваниях уха	Закапывают в ухо 2 раза в день	
17 Вазелин медицинский	Банка 25,0 г	2		Применяется в качестве мазевой основы для смазывания катетера	
18 Вазелин борный	Тубус 30,0 г			То же	

Наименование медикамента	Вид упаковки	Кол-во в судовой аптечке, штук	Показания к применению	Способ приема и дозировка	Примечание
36 Кодтерпин 0,015 г, терпин-гидрат 0,25 г, натрия гидрокарбонат 0,25 г	Конвалюта № 6	5	При сухом болезненном кашле	Принимают внутрь по 1 таблетка 3 раза в день	
37 Коллодий	Флакон 200 г		Для нанесения на небольшие осадины и раны, а также для укрепления повязок	Накладывают, на рану стерильные салфетки, закрывают сверху марлей, края которой промазывают коллодием. Быстро подсыхает и держит повязку	
38 Калий марганцовокислый	Коробка	1	Для промывания ран, полоскания рта и горла, при ожогах и отравлениях для промывания желудка. При укусах змей!	Применять наружно для промываний и полосканий: раствор слабо-розового и розового цвета; при ожогах и для промывания желудка: раствор розового цвета	При укусах змей сделать вдоль укуса разрез и сделать примочку из темно-фиолетового раствора или положить 1-2 кристалла в рану. В место укуса рекомендуется ввести под кожу 2-3 мл 1 %-ного раствора марганцовокислого калия
39 Кофеин (10%-ный раствор)	Ампула	10	При острой сердечной недостаточности (коллапс), потере сознания	Вводится подкожно 1 мл (1 ампула)	Противопоказания: при гипертонии, повышенной возбудимости центральной нервной системы. Максимальная разовая доза - 2 ампулы, максимальная суточная доза - 10 ампул
40 Кофеин-бен-зоат натрия	Конвалюта № 6	1	То же	Принимают внутрь по 1 таблетка 2-3 раза в день	Максимальная разовая доза - 0,3 г, максимальная суточная доза - 1,0 г
41 Гидрохлорид лобелина	Ампула 1,0 мл	5	При острой дыхательной недостаточности, отравлениях окисью углерода, синильной кислотой	Вводят внутримышечно 1/3 ампулы	Внимание! Максимальная разовая доза - половина ампулы, максимальная суточная доза - 1 ампула
42 Лимонная кислота	Коробка 50.0 г	1	При отравлениях щелочами	Растворяют в воде (четверть чайной ложки) и промывают желудок или	

Наименование медикамента	Вид упаковки	Кол-во в судовой аптечке, штук	Показания к применению	Способ приема и дозировка	Примечание
43 Мазь Вишневского	Банка 50,0 г	2	Для лечения фурункулов, карбункулов, при ожогах и обморожениях (ускоряет заживление ран)	Применяют в виде компрессов, повязок	
44 Мазь ихтиоловая 10 %-ная	Банка 50,0 г	1	Для лечения фурункулов и карбункулов	То же	
45 Мазь от ожогов	Банка 50,0 г	1	При ожогах кожи	Смазывают обожженную часть кожи	
46 Мазь от отморожений	Банка 50,0 г	1	При отморожении кожи	Наносят на кожу и растирают	
47 Мазь цинковая	Банка 30,0 г	1	При экземах, кожных заболеваниях, опрелости	Смазывают пораженные места	
48 Мазь ртутная желтая 1 %-ная	Банка по 5,0 г или банка по 10,0 г	5	При заболевании глаз, особенно при наличии ячменя	Смазывают ячмень или закладывают за веко	Нельзя одновременно давать внутрь йод или бром ввиду возможного образования в глазу бромистой или йодистой ртути, обладающей обжигающим свойством
49 Масло камфарное 20 %-ное	Коробка с ампулами по 2,0 г или с ампулами по 0,1 г	24	При обмороке, шока, острой сердечной недостаточности	Вводят подкожно по 1 ампуле	В случае крайней необходимости можно вводить по 1 ампуле через каждые 2-4 ч. Рекомендуется слегка подогреть ампулу в теплой воде. Для лучшего рассасывания и уменьшения боли в месте укола можно приложить грелку
50 Настойка	Флакон 10,0мл	2	При заболеваниях сердца, нервом возбуждении, бессоннице	Принимают внутрь по 20-30 капель 3-4 раза в день	
51 Настойка валерианы и лаванды	Флакон 10-15,0мл	1	То же	Принимают внутрь по 20-30 капель 3 раза в день	

Наименование медикамента	Вид упаковки	Кол-во в судовой аптечке, штук	Показания к применению	Способ приема и дозировка	Примечание
52 Настойка йода 5 %-ная	Флакон 10.0мл	1	При ранениях, как раздражающее и отлекающее средство	Смазывают края рань, мелкие царапины	
53 Настойка йода 5 %-ная	Коробка с ампулами № 10	5	Тоже	Тоже	
54 Новокаин 1-2 %-ный	Коробка № 10	3	Для разведения пенициллина	При наличии флакона пенициллина на 200 000 ед. вводят 2-4 мл новокаина, на 500 000 ед. вводят 5 мл новокаина. В 1 мл -50 000 или 100 000 ед.	
55 Новомигро-фен (амидопирин 0,2, фенацетин 0,1, кофеин 0,015, лимонная кислота 0,015, сахар 0,1)	Конвалюта № 10	5	При головной боли, болях в суставах (артритах), воспаленных мышцах (прострелах), остром ревматизме	Принимают внутрь по 1 таблетке 2-3 раза в день при головной боли или 1 таблетку перед сном	
56 Омнопон	Упаковка № 10	1	При сильных болях в случае переломов костей, повреждения тканей, при наличии крупных ран с повреждением нервов, для профилактики шока при ожогах	Принимают внутрь по 1 таб-летке при болях	Внимание! Хранить под замком. Максимальная разовая доза - 0,3 г, максимальная суточная доза -0,1 г
57 Поливитамины	Флакон	1	Для профилактики и лечения авитаминозов, при инфекционных заболеваниях, при тяжелой физической и умственной работе	Принимают внутрь по 1-2 таблетки 2-3 раза в день	

Наименование медикамента	Вид упаковки	Кол-во в судовой аптечке, штук	Показания к применению	Способ приема и дозировка	Примечание
58 Пенициллин кристаллический, натриевая соль	Флакон: 200 000 ед. 100 000 ед. 500 000 ед.	10 20 4	При наличии гнойных процессов, фурункулов, карбункулов, высокой температуры тела, воспаления легких, печени и т.д.	Во флакон стерильным шприцем добавляют 2-4 мл новокаина, потом вводят внутримышечно в верхний квадрат ягодичы по 1-2 мл (50 000 или 100 000 ед.) через 4-6 ч. В рану можно засыпать порошок пенициллина	Хранится у капитана
59 Феноксиметилпенициллин	Упаковка № 10	3	Тоже	Принимают внутрь по 1-2 таблетки через 4 ч 4-5 раз в день	Максимальная разовая доза - 400 000 ед., максимальная суточная доза - 1 200 000 ед.
60 Пираминал	Упаковка № 10	1	При головной боли	Принимают внутрь по 1 таблетке 1-3 раза в день	
61 Фенолфталеин	Конвалюта № 10	5	При хронических запорах (слабительное)	Тоже	
62 Нафтизин 0,1%-ный и мидрин 0,05 г	Флакон 10 мл	2	При катаре верхних дыхательных путей, насморке	Закапывают по 1-2 капли в каждую ноздрю через 3-4 ч	
63 Синтомицин	Упаковка № 10	3	При дизентерии, брюшном тифе	Принимают внутрь по 2 таб-летки 5 раз в день	Принимают за 20-30 мин до еды. Максимальная разовая доза - 1,5 г, максимальная суточная доза - 6,0 г
64 Синтомициновая эмульсия 10 %-ная	Банка 30,0 г	1	При гнойно-воспалительных заболеваниях кожи, ожогах, трещинах	Наносят на салфетку и при-кладывают к ране	
65 Сода питьевая	Упаковка № 20	5	При ангине, поражении глаз (при ожогах кислотами), при изжоге, кашле	При катаре и язве желудка: по 1 таблетке 2-3 раза в день после еды; при кашле: по 1 таблетке вместе с кодеином; для промывания и полосканий: 1 таблетка на стакан воды	
66 Спирт винный 96-градусный	Флакон 200,0мл	1	Как раздражающее, болеутоляющее и обеззараживаю-	Промывают раны, дают внутрь ослабленным больным 8-15,0 г	

наименование медикамента	вид упаковки	кол-во в судовой аптечке, штук	показания к применению	способ приема и дозировка	примечание
67 Спирт дена- турированный	Флакон 300,0мл	1	Как раздражающее	Накладывают в виде компресса	Применяется только как наружно! Спирт разводят пополам с водой, смачивают салфетку и накладывают на больной участок
68 Спирт наша- тарный	Коробка № 10	5	При обмороках, алкогольном отравлении	Смочив ватку, осторожно дают нюхать. При отравлении: 5-8 капель на рюмку воды	
69 Свечи гемор- роидальные	Коробка № 6	1	При геморрое и трещинах в заднем проходе	Вводят в задний проход в положении лежа (ноги подтянуть к животу)	
70 Сульфадимезин	Упаковка № 10		При гриппе, воспалении легких и т.д. (для снижения температуры тела)	Принимают внутрь: первый прием - 2-4 г, затем по 1 г через каждые 4-6 ч до сниже- ния температуры тела. Прием препарата продолжается в течение 3 сут	При лечении необходимо назначать обильное (2-3 л в день) щелочное питье (боржоми) или 1-2 таблетки соды (растворить в 1-2 ста- канах воды и пить после каждого приема). Максимальная разовая доза - 2,0 г, максимальная суточная доза - 7,0 г
71 Сыворотка про- тивостолбчатая	Ампула 1500 ед.	2	При ранениях, травмах	Вводят подкожно по одной ампуле	
72 Таблетки желудочные	Конвалюта № 10	2			
73 Тальк	Коробка 50,0 г	5	При раздражении кожи	Применяют в виде при- сыпки	
74 Галлодубильная кислота	Коробка 5,0 г	2	При воспалительных процессах слизистой оболочки полости рта, носа, зева, гор- тани; при мокнущих язвах, ожогах, про- лежнях; как крово- останавливаю- щее средство; при отравлении содой и др.	При воспалительных процессах: 1-2 %-ный раствор для полоскания; при язвах, ожогах, про- лежнях: 5-10 %-ный раствор (смочить салфетку и приложить к пораженному участку или смазать кожу); как кровоостанавливающее: 0,25-0,5 %-ный раствор; при отравлениях: 0,2 %- ный раствор (промыть желудок)	

Наименование медикамента	Вид упаковки	Кол-во в судовой аптечке, штук	Показания к применению	Способ приема и дозировка	Примечание
75 Окситетрациклин	Трубка №10: по 100 000 ед. по 200 000 ед	21	При воспалении легких, дизентерии, воспалительных процессах и нагноениях, инфекциях мочеполовой системы	Принимают внутрь по 1-3 таблетки 3-4 раза в день в течение 4-6 дней	
76 Хлорамин	Пакет 200.0 г	10	При инфекционных заболеваниях	Для проведения дезинфекции	
77 Хлорная известь	Пакет 3 кг	1	Тоже	Тоже	
78 Хлористый кальций (10%-ный раствор)	Флакон 500,0г	1	При кровохарканье, рвоте с кровью, крови в моче; как средство, способствующее свертыванию крови; при отравлении солями магния, щавелевой кислотой как противоядие	Принимают внутрь по 1 столовой ложке 3-4 раза в день	
79 Эфедрин гидрохлорид	Конвалюта № 10 или коробка № 10	1	При коллапсе и шоке для возбуждения центральной нервной системы, сердечно-сосудистой системы и дыхательного центра	Принимают внутрь по 1 таблетке 3 раза в день	Противопоказания: гипертония, атеросклероз. Максимальная разовая доза - 0,05 г, максимальная суточная доза - 0,15 г